

郎溪县创建全国林长制 示范区工作简报

第 120 期

中共郎溪县委林长制工作领导小组办公室

2022 年 2 月 18 日

★知识理论

乡村护林（草）员管理办法

第五章 管理职责

第十九条 县级林业和草原主管部门应当在县级人民政府领导下加强对乡村护林员队伍建设与管理工作的组织领导，建立统一的乡村护林员管理制度。

第二十条 县级林业和草原主管部门应当加强对乡村护林员工作的指导和监督检查，逐步加大乡村护林员队伍标准化、规范化建设力度。

第二十一条 县级林业和草原主管部门应当编制乡村护林员培训方案。乡镇林业工作站应当组织对乡村护林员进行上岗前培训和定期培训，培训内容包括相关法律、法规、规章、政策、岗位职责、业务知识、基本技能、安全防护等，提升乡村护林员的管护能力和责任意识。

第二十二条 乡镇林业工作站应当在乡镇人民政府领导或者指导下统筹划定乡村护林员的管护责任区，统筹安排，实行网格化管理。

第二十三条 县级林业和草原主管部门应当指导乡镇林业工作站建立健全乡村护林员管理档案，档案内容包括乡村护林员的申请材料、审核表、管护劳务协议、考核表、解聘通知书等。

乡镇林业工作站应当进行乡村护林员有关数据统计和更新，定期上报县级林业和草原主管部门。

第二十四条 有乡村护林员三人以上的行政村，应当在村民委员会组织下成立村护林小组，指定负责人，制订巡护计划和方案，落实巡护责任。

乡村护林员不足三人的行政村，可以由乡镇林业工作站在乡镇人民政府领导或者指导下组织相邻行政村成立联合护林小组，指定责任人，制订巡护计划和方案，落实巡护责任。

第二十五条 乡镇林业工作站在乡镇人民政府领导或者指导下对乡村护林员进行考核，并将考核结果报县级林业和草原主管部门备案。

乡村护林员考核结果应当与奖惩、续聘挂钩。

第二十六条 乡村护林员有下列突出贡献的，按照国家有关规定给予表彰、奖励：

（一）模范履行巡护责任，管护区内连续两年未发生破坏林草资源情况，成绩显著的；

（二）严格执行森林草原防火法规制度，及时发现并报告森

林草原火情，避免造成重大损失的；

（三）及时发现并报告有害生物危害，为主管部门有效防控提供信息的；

（四）劝阻、制止破坏林草资源的行为，使林草资源免遭重大损失的；

（五）为侦破破坏林草资源重特大案件提供关键线索的；

（六）在其他方面有突出贡献的。

★工作动态

绿水青山的那一抹红—郎溪彩枫农林科技红橡树推广种植

发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。郎溪县坚定不移地践行"两山"理念，不断探索“两山”转化路径，带动农民增收致富，以绿化、彩化、财化为抓手不断将"绿水青山"的生态优势转化为乡村发展的产业动能。



红橡树，学名红栎，又名娜塔栎。高大乔木，挺拔、木质坚硬，生长速度较快，耐旱、耐寒，树冠匀称、枝叶稠密，原产于美国东部，是西方国家常用的木料，中国长江中下游也有分布，

是优良的城市观赏树种。一些选育品种常作绿化树，用于美化环境，在街道、公园、校园和球场用作遮阴树，广泛用于城市绿化，同时具有生态价值，可用于地被恢复。我国种植红橡树时间较晚，近几年才被广泛认可。

安徽彩枫农林科技有限公司成立于 2011 年，现已发展为生物组培车间 1000 平米、驯化大棚 20 亩，苗木种植面积 3000 亩的现代林木企业。公司 2012 年从美国引进红橡树种植，红橡树叶形美丽，色彩斑斓，秋季叶色逐渐变为红色，红叶期长，观赏效果好。作为优良景观树种在我县十字、飞鲤、毕桥、姚村、涛城、建平 6 个镇均有种植，为我县取得“中国天然氧吧”称号、安徽省生态文明建设示范县荣誉起到了积极作用。



安徽彩枫农林科技有限公司与中国林科院、安徽省农科院紧密合作，通过近 5 年研发，培育“金莉”“丹莉”等新品种，已向国家林草局新品种保护办公室申报新品种权。2021 年该公司红橡树生产基地已扩展种植面积 3000 亩，销售额为 800 万元，公司彩叶树种热销售长三角、胶东半岛。红橡树生产基地在发展壮大的同时，也带动了周边农户增收致富，当地村民把旱地、山地租给公司，带来土地流转资金收入，村民还可以就近在基地务工就业。在红橡树种植基地里长期务工的村民就有 50 多人，农忙时用工人员达百人以上，不仅有效解决了当地农民务工

问题，还带动了脱贫户脱贫增收。

在红橡林穿行，仿佛置身于红色海洋，身姿挺拔的红橡树尽显勃勃生机，红橡林只是我县造林绿化的一个微小缩影。郎溪县红橡树推广种植，为我县人民群众经济收入的提高和美丽乡村生态建设提供了一抹亮眼的红。

★图片信息



2月15日，郎溪县凌笪镇苗木交易市场，种植户在购买朴树苗。早春时节，万物复苏，苗木种植进入黄金期，种植户们抢抓时节买苗、种苗，在绿化美化环境的同时，提高家庭收入。

★植物科普



锦鸡儿

别名雀花、土黄豆、粘粘袜、酱瓣子、阳雀花、黄棘，豆科、锦鸡儿属落叶灌木，花生叶腋，4至5月开花，瓣端稍尖，旁分两瓣，势如飞雀，色金黄，故名“金雀花”。同属植物约50余种，中国产40余种。

形态特征

灌木，高 1-2 米。树皮深褐色；小枝有棱，无毛。托叶三角形，硬化成针刺，长 5-7 毫米；叶轴脱落或硬化成针刺，针刺长 7-15（25）毫米；小叶 2 对，羽状，有时假掌状，上部 1 对常较下部的为大，厚革质或硬纸质，倒卵形或长圆状倒卵形，长 1-3.5 厘米，宽 5-15 毫米，先端圆形或微缺，具刺尖或无刺尖，基部楔形或宽楔形，上面深绿色，下面淡绿色。

花单生，花梗长约 1 厘米，中部有关节；花萼钟状，长 12-14 毫米，宽 6-9 毫米，基部偏斜；花冠黄色，常带红色，长 2.8-3 厘米，旗瓣狭倒卵形，具短瓣柄，翼瓣稍长于旗瓣，瓣柄与瓣片近等长，耳短小，龙骨瓣宽钝；子房无毛。

分布

生于山坡和灌丛。产河北、陕西、江苏、江西、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西北部、四川、贵州、云南、新疆东北部。

用途及价值

锦鸡儿具有一定的观赏价值，开花时花朵金灿灿的，十分耀眼。在园林中可植于岩石旁，小路边，或作绿篱用，亦可作盆景材料。锦鸡儿含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素、多种矿物质等成分。它的根和花都可以用作药物。

送：市林长办、县级总林长、县级林长、县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县级林长联席会议成员单位、各乡镇党委政府、乡镇林长制办公室

编辑：潘均

校核：戴华芹

审核：朱顺林